



Tus problemas de plagas
hacelos polvo!



Dast

La opción de mayor residualidad.



gleba
AMBIENTAL



Dast

Polvo de espolvoreo (P).

Deltametrina 0,2 %.

PRESENTACIÓN

Envase: Pomo con pico aplicador x 100 gr. (Caja x 4,8 kilos).
Pote x 1 kilo (Caja x 12 kilos).
Bolsa x 5 kilos (Bolsa 4 x 5).

INSCRIPCIÓN INAL N° 0250016

ASPECTOS RELEVANTES

DAST es un polvo insecticida, listo para usar, formulado en base a carbonato cálcico micronizado y deltametrina. Estos componentes le confieren un color blanco tiza, excelente fluidez, alta residualidad y gran poder insecticida. El ingrediente activo es un piretroide sumamente efectivo en baja concentración, por eso el producto resulta sumamente seguro y eficaz. El polvo se adhiere fácilmente a distintas superficies, inclusive la cutícula de insectos. Por esta razón, DAST puede actuar por contacto e ingestión durante la actividad de limpieza que realizan los insectos.

¿QUE CONTROLA?

Posee excelente efecto insecticida sobre una gran diversidad de insectos rastreros. Puede utilizarse para controlar plagas urbanas tales como cucarachas, hormigas, chinches de cama, pulgas, etc. En granos almacenados DAST posee efecto sobre gorgojos, carcomas, tenebrios, y distintos tipos de polillas.

¿DONDE SE APLICA?

DAST es un producto ideal para sitios donde no pueden aplicarse insecticidas líquidos por el riesgo eléctrico (motores, tableros eléctricos, llaves de luz, etc.) o en sitios estancos donde se requiera alta residualidad (grietas, rajaduras, puertas huecas, paredes huecas, cañerías, estructuras metálicas de caño, tapa rollos, cielos rasos, etc.).

BUEN USO

DAST debe espolvorearse directamente en grietas, hendiduras, nidos y sitios de tránsito de insectos plaga. Coloque el pico del pomo en sentido horizontal y presione en el centro para lograr el espolvoreo deseado. En caso de utilizar aplicadores de polvo eléctricos, dosifique el polvo en el recipiente correspondiente en la cantidad necesaria. Siempre utilice guantes, protección ocular y respiratoria adecuada durante la manipulación, dosificación y aplicación del producto.

■ DOSIS DE USO INSECTOS RASTREROS:

Cucarachas (60 gramos / 10 m²).

Pulgas (50 gramos / 10 m²).

Hormigas (40 a 60 gramos / 10 m²).

Chinche de Cama (40 a 60 gramos / 10 m²).

■ **MODO DE EMPLEO EN GRANOS:** DAST puede ser aplicado sobre pisos de bodegas y silos, o bien, mezclado directamente sobre los granos a almacenar. Para ello, se recomienda colocar una capa de DAST por cada 25 a 30 centímetros de altura de granos al momento del llenado o del transilado.

DOSIS DE USO

Tratamiento sobre piso (50 a 60 gramos / 10 m², 6 mese protección).

Tratamiento sobre grano (500 a 1.000 gramos / TN grano, 6 a 12 meses de protección).

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR
DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

